Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Québec

B I 0 1 3

Date de naissance Année	Mois	Jour	Nº de dossier
Nom à la naissance			Prénom

☐ Sélectionner un RLS

■ ÉCOLE:

PLAN D'URGENCE

POUR ÉPILEPSIE AVEC DIASTAT

Année scolaire : Sélectionner une date

Niveau Scolaire : Sélectionner un niveau

Personnel formé pour administrer le DIASTAT	Localisation du DIASTAT	Date d'expiration
	Particularités :	

INTERVENTIONS RECOMMANDÉES

En présence de crise

- Installer le jeune en position sécuritaire soit allongé sur le côté
- Demeurer avec le jeune
- Ne pas bouger le jeune
- Éloigner les curieux
- Ne rien introduire dans sa bouche
- Ne pas retenir ses mouvements
- Placer quelque chose de mou sous sa tête et son cou afin de prévenir les blessures.
- Éloigner tout objet dangereux.
- S'assurer qu'aucun obstacle ne gêne sa respiration et tourner sa tête de côté
- **Noter la durée et l'heure de la fin de la crise**

Si la crise dure: Moins (-) de 5 minutes	Si la crise dure: Plus (+) de 5 minutes
Après la crise : 1. Rassurer et réconforter le jeune. 2. Lui permettre de se reposer si nécessaire. 3. Ne jamais le laisser sans surveillance. 4. Aviser les parents et la direction. 5. Compléter le rapport d'observation de la crise et le remettre aux parents. 6. Reprendre les activités régulières. 7. **APPELER 9-1-1 À L'OCCURRENCES DE L'UNE DES SITUATIONS MENTIONNÉES AU VERSO.**	1. Donner immédiatement le DIASTAT selon la technique. **(Voir la technique AU VESRSO)** 2. Composer le 9-1-1-, transport par ambulance accompagné d'un adulte. 3. Parler doucement et rassurer le jeune. 4. Ne jamais le laisser sans surveillance. 5. Aviser les parents et la direction. 6. Compléter le rapport d'observation de la crise et le remettre aux ambulanciers.

FDCU-SPU-032

Appeler le 9-1-1- dès la présence d'UNE de ces situations :

- Le jeune ne reprend pas conscience, sa respiration demeure difficile après la fin de la crise ou le pourtour de sa bouche est bleutée.
- Une 2e crise survient sans qu'il y ait retour à la normale après la première.
- La confusion après la crise dure plus d'une heure.
- Il s'agit d'une première crise (non connu épileptique).La crise survient dans l'eau.
- Le jeune est blessé.
- Le jeune est connu diabétique.

TECHNIQUE D'ADMINISTRATION DU **DIASTAT**




1- Positionner sécuritairement




2- Retirer le couvercle et vérifier le dosage




3- Lubrifier l'embout



4- Visualiser l'anus



5- Introduire l'embout dans le rectum



6- Injecter le médicament en 3 secondes et compter encore 3 secondes avant de retirer l'embout



7- Tenir les fesses fermées 3 secondes

Garder le jeune au repos

Source : Méthode de soins informatisée. Crédit image : AQESSS

Signature neurologue	Nom en caractère d'imprimerie	Date
	Amélie Nadeau 06112	

** Original à envoyer au dossier une fois l'année scolaire terminée.*