Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Québec

B I 0 1 3

| Date de naissance Année | Mois | Jour | N° de dossier |
|---|---|---|---|
| Nom à la naissance | | | Prénom |

☐ Sélection de RLS

■ ÉCOLE:

# PLAN D'URGENCE
POUR ÉPILEPSIE

**Année scolaire :** Sélection

**Niveau Scolaire :** Sélectionner un niveau

**Particularités:**

## INTERVENTIONS RECOMMANDÉES

### En présence de crise

- Installer le jeune en position sécuritaire soit allongé sur le côté.
- Demeurer avec le jeune.
- Ne pas bouger le jeune.
- Éloigner les curieux.
- Ne rien introduire dans sa bouche.
- Ne pas retenir ses mouvements.
- Placer quelque chose de mou sous sa tête et son cou afin de prévenir les blessures.
- Éloigner tout objet dangereux.
- S'assurer qu'aucun obstacle ne gêne la respiration et tourner sa tête de côté.
- **Noter la durée et l'heure de la fin de la crise.**

**Si la crise dure:** Moins (-) de 5 minutes

**Après la crise :**

1. Rassurer et réconforter le jeune.
2. Lui permettre de se reposer si nécessaire.
3. Ne jamais le laisser sans surveillance.
4. Aviser les parents et la direction.
5. Compléter le rapport d'observation de la crise et le remettre aux parents.
6. Reprendre les activités régulières.
7. **APPELER 9-1-1 À L'OCCURRENCES DE L'UNE DES SITUATIONS MENTIONNÉES AU VERSO.**

**Si la crise dure:** Plus (+) de 5 minutes

1. Composer le 9-1-1-, transport par ambulance accompagné d'un adulte.
2. Parler doucement et rassurer le jeune.
3. Ne jamais le laisser sans surveillance.
4. Aviser les parents et la direction.
5. Compléter le rapport d'observation de la crise et le remettre aux ambulanciers.

FDCU-SPU-030

## Appeler le 9-1-1- dès la présence d'UNE de ces situations :

| | |
|---|---|
| 911 | • Le jeune ne reprend pas conscience, sa respiration demeure difficile après la fin de la crise ou le pourtour de sa bouche est bleutée.<br>• Une 2e crise survient sans qu'il y ait retour à la normale après la première.<br>• La confusion après la crise dure plus d'une heure.<br>• Il s'agit d'une première crise (non connu épileptique).<br>• La crise survient dans l'eau.<br>• Le jeune est blessé.<br>• Le jeune est connu diabétique.<br><br>*Source : Alliance canadienne de l'épilepsie* |

| Signature du neurologue | Nom en caractère d'imprimerie | Date |
|---|---|---|
| | AMÉLIE NADEAU 06112 | |

C.C. ARCHIVES CHUS

** Original à envoyer au dossier une fois l'année scolaire terminée.*