BUCCOLAM[MD] est utilisé chez les patients âgés de 3 mois à moins de 18 ans pour traiter les crises épileptiques inhabituelles qui durent plus de 5 minutes. Le patient doit avoir déjà reçu un diagnostic d'épilepsie.

BUCCOLAM[MD]
SOLUTION BUCCALE DE MIDAZOLAM

Mode d'action de BUCCOLAM[MD] :
BUCCOLAM[MD] appartient à un groupe de médicaments appelés benzodiazépines. Il agit en calmant le cerveau et les nerfs.

Prenez BUCCOLAM[MD] exactement comme votre professionnel de la santé vous l'a prescrit.
En cas de doute ou d'oubli, consultez votre professionnel de la santé. BUCCOLAM[MD] doit être pris uniquement dans la bouche, entre la gencive et la joue. Il ne doit pas être administré par d'autres voies. Ne PAS utiliser d'aiguilles ni de tubes.

MARCHE À SUIVRE POUR LES PROCHES AIDANTS ÉTAPE PAR ÉTAPE

Avant d'administrer BUCCOLAM[MD]




Si l'enfant a une crise, laissez-le bouger librement, n'essayez pas de le retenir. Ne le déplacez que s'il est en danger, par exemple s'il se trouve près d'une source d'eau profonde, d'un feu ou d'objets tranchants.




Si possible, tournez l'enfant doucement sur le côté. **Soutenez sa tête** avec quelque chose de souple, comme un coussin ou vos genoux.


Préparation de BUCCOLAM[MD]



Tenez le tube en plastique et retirez le capuchon. Retirez la seringue du tube.



Retirez le capuchon rouge de l'embout de la seringue et jetez-le de manière sécuritaire.



IMPORTANT
Assurez-vous que l'embout translucide soit entièrement retiré. Si nécessaire, il doit être retiré manuellement AVANT l'administration, afin d'éviter qu'il ne tombe dans la bouche de l'enfant.

Administration de BUCCOLAM[MD]



1. PINCEZ

À l'aide du pouce et de l'index, pincez doucement la joue de l'enfant et tirez-la vers l'arrière.

Placez l'embout de la seringue à l'arrière de l'espace situé entre l'intérieur de la joue et la gencive inférieure (cavité buccale).



2. APPUYEZ

Appuyez lentement sur le piston de la seringue jusqu'à ce qu'il s'arrête. La dose complète de solution doit être administrée lentement dans l'espace entre la gencive et la joue.

Si votre professionnel de la santé vous le prescrit (pour des volumes plus importants et/ou des patients plus petits), vous pouvez administrer environ la moitié de la dose lentement dans un côté de la bouche, puis l'autre moitié dans l'autre côté de la bouche de l'enfant.



Restez avec l'enfant jusqu'à la fin de la crise.
Notez l'heure à laquelle BUCCOLAM[MD] a été administré ainsi que la durée de la crise.

BUCCOLAM[MD]

SOLUTION BUCCALE DE MIDAZOLAM

Quand appeler pour obtenir une aide médicale immédiate

Suivez TOUJOURS les conseils de traitement fournis par le professionnel de la santé du patient ou tels qu'expliqués par un professionnel de la santé. En cas de doute, appelez immédiatement les secours médicaux si :

- la crise ne s'arrête pas dans les 10 minutes;
- vous ne parvenez pas à vider la seringue ou vous renversez une partie du contenu;
- la respiration de l'enfant ralentit ou s'arrête (par exemple, respiration lente ou superficielle ou lèvres bleues);
- vous observez des signes d'une crise cardiaque, qui peuvent inclure une douleur thoracique ou une douleur qui s'étend au cou et aux épaules et descend le long du bras gauche;
- l'enfant est malade (vomissements) et la crise ne s'arrête pas dans les 10 minutes.

Conservez la seringue afin de la montrer aux paramédics ou au professionnel de la santé.

Ne donnez pas une autre dose de BUCCOLAM[MD] au patient.

- Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à un professionnel de la santé.

Conservation de BUCCOLAM[MD]

- Conserver dans un endroit sûr, à température ambiante (entre 15 °C et 30 °C). Ne pas réfrigérer ni congeler.
- Conserver la seringue orale dans son tube protecteur en plastique.
- Ne pas utiliser ce médicament si l'emballage a été ouvert ou endommagé, ni après la date de péremption.
- Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

BALAYEZ CE CODE QR POUR EN SAVOIR PLUS

BALAYEZ CE CODE QR POUR VISIONNER UNE VIDÉO SUR LES ÉTAPES DE L'ADMINISTRATION

PENDOPHARM

BUCCOLAM[MD] et son logo sont des marques déposées détenues par Neuraxpharm PHARMACEUTICALS, S.L., utilisées sous licence par Pendopharm, une division de Pharmascience inc.
Pendopharm[MD] et son logo sont des marques déposées détenues par Finchley Recherche et développement inc., utilisées sous licence par Pendopharm, une division de Pharmascience inc.
© 2026 Pharmascience inc., Montréal (Québec) H4P 2T4 Canada. Tous droits réservés. APP81432RV260107