Supplément à NB N° 1 – 1 janvier 2025

Vidéo Instructions Stylo fremanezumab

Ajovy® (Fremanezumab)
Instructions d'utilisation du stylo

Frémanézumab 225 mg stylo prérempli pour la prévention de la migraine, chez les adultes qui ont au moins 4 jours de migraine par mois.

Avant d'utiliser le stylo prérempli frémanézumab, lisez les instructions étape par étape et suivez-les attentivement.


Préparation de l'injection (Accordez une attention particulière à l'étape 5 !!!)

- Retirez le stylo prérempli frémanézumab de son emballage ; **ne le secouez pas**.
- Laissez frémanézumab se réchauffer à température ambiante **pendant 30 minutes** avant l'injection.
- Rassemblez les éléments suivants :
  - 1 ou 3 stylo(s) prérempli(s) frémanézumab 225 mg, selon ce que votre médecin vous a prescrit
  - Lingettes alcoolisées
  - compresses de gaze ou tampons d'ouate
  - conteneur à aiguilles

Informations importantes :

- Le stylo prérempli frémanézumab est à usage unique strict.
- Chaque stylo prérempli contient 225 mg de frémanezumab. Selon la dose qui vous a été prescrite, vous aurez besoin d'utiliser 1 ou 3 stylo(s) prérempli(s).
- Frémanézumab est injecté sous la peau (injection sous-cutanée). Vous ne devez pas réaliser d'injection avant que votre médecin ou infirmier/ère ne vous ait expliqué comment faire.
- Lisez attentivement la notice pour en savoir plus sur votre médicament.
- **Ne secouez pas** le stylo prérempli.
- **Replacez immédiatement la boîte au réfrigérateur** s'il reste des stylos préremplis inutilisés dans la boîte.


Instructions étape par étape pour l'injection



Étape 1 : Lavez-vous les mains à l'eau et au savon et séchez-les bien à l'aide d'un essuie-main propre.


Étape 2 : Vérifiez votre stylo prérempli frémanézumab.

- Vérifiez que le nom frémanézumab figure bien sur le stylo, et que la date de péremption figurant sur l'étiquette n'est pas encore dépassée.
- Vérifiez dans la fenêtre de visualisation du stylo que le médicament est bien limpide et incolore à jaunâtre.



Ne l'utilisez pas si :

- Le stylo est resté pendant plus de 7 jours en dehors du réfrigérateur ;
- La date de péremption du stylo est dépassée ;
- Le stylo présente des dommages visibles tels que cassures ou fuites ;
- Le liquide contient des particules ou est décoloré, trouble ou congelé (ou a été congelé).



Il peut y avoir des bulles d'air dans le stylo prérempli. C'est normal.
N'essayez pas de retirer les bulles d'air du stylo avant d'administrer l'injection.

Étape 3 :

Choisissez la zone d'injection.

- Le ventre (partie inférieure de l'abdomen) évitez une zone d'environ 5 cm autour du nombril.
- L'avant des cuisses : une zone située au moins 5 cm au-dessus du genou et 5 cm en dessous de l'aine.
- L'arrière de la partie supérieure du bras : dans la partie charnue à l'arrière de la partie supérieure du bras.



Si vous devez réaliser plusieurs injections, vous pouvez les administrer dans la même zone ou dans une zone différente (abdomen, cuisse, partie supérieure du bras). En cas d'injections multiples, veillez à ne pas injecter exactement au même endroit.

Étape 4 :


Nettoyez le site d'injection.

- Nettoyez le site d'injection avec une nouvelle lingette alcoolisée.
- Laissez la peau sécher pendant 10 secondes avant l'injection.
- N'injectez pas frémanézumab dans une zone sensible, rouge, chaude, durcie ou tatouée ni dans un bleu, des cicatrices ou des vergetures.

Étape 5 :

Retirez le capuchon de protection et mettez-le de côté.

- Retirez le capuchon de protection en tirant tout droit. Ne pas tourner.
- La protection métallique de l'aiguille ressort avec le capuchon de protection.
- Ne remettez pas le capuchon de protection sur le stylo pour éviter blessures et infections.
- Ne touchez pas la zone de la protection de l'aiguille.



Étape 6 :


A. Placez le stylo prérempli à un angle de 90 degrés sur votre peau.

B. Appuyez sur le stylo vers le bas pour l'activer ; il n'y a pas de bouton. Vous entendrez un **DÉCLIC**. Le piston bleu descend à travers la fenêtre.

C. Maintenez le stylo appuyé sur votre peau pendant environ **15 secondes**, jusqu'à ce que vous entendiez un deuxième **DÉCLIC**.

D. Attendez encore **10 secondes** avant de retirer le stylo de la peau.


Durée : **30 secondes**
Attention : maintenez une pression constante sur le stylo pendant toute la durée de l'injection



Étape 7 :

Retirez le stylo de la peau.

Vérifiez que le piston bleu a rempli la fenêtre de visualisation ; vous pouvez maintenant voir l'arrêt gris. Retirez le stylo de la peau en tirant bien droit vers le haut. Lorsque vous retirez le stylo de votre peau, le système de protection de l'aiguille revient à sa place initiale et se verrouille, recouvrant ainsi l'aiguille. **Ne replacez pas** le capuchon sur le stylo prérempli afin d'éviter de vous blesser ou de vous infecter.



Étape 8 :

Utilisez une boule d'ouate ou une compresse de gaze propre et sèche que vous presserez délicatement sur le site d'injection pendant quelques secondes. Ne frottez pas le site d'injection et ne réutilisez pas le stylo.

Étape 9 :

Élimination du stylo prérempli.

- Mettez votre stylo usagé dans un conteneur à aiguilles immédiatement après son utilisation.
- Ne jetez pas les stylos usagés à la poubelle.
- Ne pas réutiliser les récipients pour objets tranchants après usage.
- Si votre dose est de 675 mg, répétez les étapes 2 à 9 avec le deuxième et le troisième stylo frémanézumab pour injecter la dose complète.
- Demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmière comment jeter le récipient.

Remarque :

Consultez la notice pour lire les instructions complètes concernant l'administration de l'injection de frémanézumab.

Ce matériel est purement informatif et ne doit être remis par un médecin à un patient qu'après qu'il a été décidé que le patient recevrait ce traitement.

AJO-BE-00213/TevaPharmaBelgium Date of Approval: February 2026